

Tingnan ang likurang bahagi para sa mga babala

Pangalan ng Pasyente

Ay gumagamit ng **EXTRANEAL** (Icodextrin 7.5%) peritoneal dialysis solution.

Pang-emergency na Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Dialysis Unit _____

Iba Pang Contact _____

Ang BAXTER at EXTRANEAL ay mga trademark ng Baxter International Inc.
PSTGL04IR3. Petsa ng Paghahanda. Nobyembre 2019. ADV06/628R.

Baxter Healthcare Philippines Inc.

Silangan Industrial Estate Brgy. Canlubang Calamba City Laguna Philippines 4028
Tel +63 2 7238 8080 Fax +63 2 7238 8034

B A B A L A :

Potensyal na Maling Pagbasa ng Glucose sa Dugo

Gumamit **LAMANG** ng mga monitor ng glucose at strip para sa pagsusuri na partikular sa glucose. Ang mga pamamaraang ito ay karaniwan sa mga laboratoryo ng klinika. Makipag-ugnayan sa tagagawa ng mga monitor ng glucose at strip para sa pagsusuri upang matukoy ang pamamaraan ng paggamit.

HUWAG gumamit ng mga monitor ng glucose o test strip na gumagamit ng mga paraang glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) o glucose-dye-oxidoreductase. Bilang karagdagan, ang ilan ngunit hindi lahat ng monitor o strip para sa pagsusuri na gumagamit ng paraang glucose dehydrogenase dinucleotide (GDH-FAD) ay hindi dapat gamitin. Ang paggamit sa mga pamamaraang ito ay maaaring magresulta sa maling pagtaas at pagbasa ng glucose sa dugo sa mga pasyenteng gumagamit ng **EXTRANEAL** (icodextrin 7.5%) dahil sa maltose interference. Maaaring maitago ng hindi totoong mataas na pagbasa ng glucose sa dugo ang totoong hypoglycemia o humantong sa maling diagnosis ng hyperglycemia, na maaaring humantong sa mga pangyayari na maaaring magbanta sa buhay ng pasyente.

Bisitahin ang www.glucosesafety.com para sa karagdagang impormasyon, kasama ang listahan ng tugmang monitor ng glucose.

Baxter